



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Хакасия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия)

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д.5А-1
Тел. 8(3902) 22-26-81, e-mail: info@19.rospotrebnadzor.ru <http://19.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76760587, ОГРН 1051901007421, ИНН/КПП 1901066489/190101001

01.10.2026

19-00-02/27-13164-2026

Главам администраций
городских округов и
муниципальных районов
Республики Хакасия

О профилактике трихинеллеза

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия в рамках Комплексного плана по профилактике паразитарных болезней в Республике Хакасия на 2025 - 2027 годы, информирует:

На фоне активности бурых медведей значительно возросли риски возникновения случаев заболевания трихинеллёзом среди людей, связанных с употреблением мяса (медвежатины), не прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу.

По информации Управления ветеринарии Республики Хакасия участились случаи обнаружения личинок трихинелл по результатам микроскопического исследования мяса добытых бурых медведей (5). Управлением организовано проведение необходимых лечебно-диагностических мероприятий в отношении лиц, занятых в добыче инвазированного бурого медведя (охотников), медицинское наблюдение продолжается.

На основании ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаем:


-усилить контроль за соблюдением правил реализации мяса и мясопродуктов на рынках, предприятиях торговли всех форм собственности, обращая особое внимание на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания животного происхождения;

-принять меры по организации дератизационных мероприятий в животноводческих хозяйствах всех форм собственности;

-активизировать разъяснительную работу с населением о профилактике трихинеллеза. Ситуация находится на контроле Управления.

Приложение: на 1 л.

Руководитель



Т.Г. Романова

Копылова Ирина Александровна, 8(3902) 34-36-15



Меры профилактики

- Приобретать мясо и мясные изделия только в санкционированных торговых точках при наличии документов, удостоверяющих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификатов пищевого сырья и пищевых продуктов.
- Исключить из пищи сырое, недоваренное или непрожаренное мясо, дегустацию сырого мясного фарша.
- Подвергать тщательной термической обработке высокими температурами мясо и мясные изделия, особенно диких животных.
- После контакта с сырым мясом обязательно обработать руки и кухонный инвентарь с помощью моющих средств.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиенического образования населения»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1

e-mail: cgon@cgon.ru
тел.: 8 (499) 241 86 28



Трихинеллез



Подготовлено на основании материалов
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора

Подготовлено на основании материалов
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора

Трихинеллез

Паразитарное заболевание, вызываемое мелкими гельминтами — нематодами.

Кто может заболеть?

Люди, употребляющие в пищу недостаточно термически обработанное мясо диких животных - бурого медведя, кабана, барсука, а также домашних животных - свиньи и, в некоторых случаях, собаки.

Личинки трихинелл хорошо переносят копчение, жарение, варку, обработку в микроволновой печи и замораживание, соление.

Пораженное мясо по внешнему виду, запаху, вкусу не отличается от доброкачественных продуктов



Симптомы

Часто протекает остро, с высокой температурой до 40°C, сильными мышечными болями, отеками век, «одутловатостью» лица, болями при глубоком вдохе, кашлем, кожной сыпью, зудом, потерей аппетита и диареей. Выделяют лёгкую, среднетяжелую и тяжелую формы заболевания. При тяжелом трихинеллёзе развиваются осложнения.

В редких случаях заболевание трихинеллезом не дает существенных отклонений в состоянии здоровья. Тогда заражение выявляется только при обнаружении специфических антител в крови.

Тяжесть заболевания определяется количеством личинок трихинелл, съеденных вместе с мясом, и индивидуальными особенностями организма.

Осложнения

Обычно наступают в течение 3-5 недель болезни:

- миокардит,
- пневмония,
- абдоминальный синдром,
- менингоэнцефалит.

Следствием этих процессов может стать острая сердечная и дыхательная недостаточность, паралич, парез, тромбгеморрагический синдром, инфекционно-токсический шок и нарастающая энцефалопатия.

